

Beitrag zur
Kenntnis von Verbindungen der
Diphenylsuccindan-Reihe.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktormwürde

der

Hohen Philosophischen Fakultät der Universität

Marburg

vorgelegt von

Werner Gabel
aus Chemnitz.

Marburg 1932.

Buchdruckerei H. K. Hilber Nachf.

Als Dissertation angenommen am 14. Februar 1932.

Berichterstatter: Herr Prof. Dr. K. Brand.

Tag der mündlichen Prüfung: 24. Februar 1932.

Gedruckt mit Genehmigung der Fakultät.



Beitrag zur Kenntniss von Verbindungen der Diphenysuccindan-Reihe.

Reimer¹⁾ hatte bei der Kondensation von 1.2-Diphenylbernsteinsäure (I) mit konzentrierter Schwefelsäure eine Verbindung der Zusammensetzung $C_{16}H_{10}O_2$ erhalten, die er Dibenzyl-dikarbonid nannte. Die chemische Natur dieser Verbindung wurde vor mehr als vierzig Jahren hier in Marburg von Roser²⁾ aufgeklärt: sie erwies sich als ein ringförmiges Diketon, bestehend aus zwei kondensierten Indanon-1-Ringen, denen das 2- und 3-Kohlenstoffatom gemeinsam gehören. Um die genetischen Beziehungen des Diketons zu der Diphenylbernsteinsäure (I) zum Ausdruck zu bringen, nannte Roser die Verbindung „Diphenysuccindon“ (II). Diesen Namen änderte später Brand³⁾ auf Vorschlag von Pschorr in „Diphenysuccindan-dion-9.12“ um; dadurch wurde Uebereinstimmung mit der Nomenklatur erreicht, die in der „Inden-Reihe“ üblich ist.





Diphenysuccindan-dion-9.12 (II) ist farblos, aber seine Lösungen in Natron- und Kalilauge sehen orangefarben aus. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß die Farbtäger dieser Lösungen Salze des 9.12-Dioxy-diphenysuccindadiens-9.11 (III) sind, das als die Di-enolform des Diphenysuccindandions-9.12 angesehen werden darf⁴⁾.

1) B. 14, 1802 (1881)

2) A. 247, 153 (1888)

3) B. 45, 3074 (1912)


4) K. Brand u. O. Loehr, J. pr. (2) 109, 355 (1925).



Das Diphensuccindandion-9.12 (II) enthält eine Butankohlenstoffkette zwischen zwei Benzolkernen, mit diesen zu zwei fünfgliedrigen Ringen verbunden. Diese Butankohlenstoffkette ist gesättigt. Von den Diketonen, die zwischen zwei Benzolkernen eine offene gesättigte Butankohlenstoffkette

enthalten, entspricht dem Diphenylsuccindan=dion=9.12 (II) das α, β -Dibenzoyl-äthan (α, δ =Dioxo= α, δ =diphenylbutan = IV) 5). Die Verbindung ist gleichfalls farblos.

Isomer mit dem Diphenylsuccindan=dion=9.12 (II) sind die beiden Stereoisomeren α, β -Dibenzoyl-äthylene (α, δ =Dioxo= α, δ =diphenyl- β =butylene = Va und Vb) 6), sie unterscheiden sich also vom Diphenylsuccindan=dion=9.12 (II) ganz wesentlich durch den ungesättigten Charakter ihrer Butankohlenstoffkette.



α, β -Dibenzoyl-äthylen existiert in einer cis- und in einer trans-Form; eine der beiden Formen ist farblos, nach Ansicht von Paal und Schulze 7) die cis-Form, während die trans-Form gelbe Nadelchen bildet. Man sieht aus den obenstehenden Formeln, daß in bezug auf die Lage der Benzolkerne zu den Kohlenstoffatomen der Butankohlenstoffkette nur das trans-Dibenzoyl-äthylen (Va), also nach

5) J. Beilstein, *H. d. o. Ch.* (4. Aufl.) VII, 773 (1925), VII. Erg. Bd. 401 (1931).

6) J. Beilstein, *H. d. o. Ch.* (4. Aufl.) VII. 812 (1925).

Die gewählte Formelschreibweise soll lediglich die formalen Beziehungen der Verbindungen zu den Abkömmlingen des Diphenylsuccindan=dions zum Ausdruck bringen.

7) B. 33, 3795 (1900); B. 35, 168 (1902). Smedley (*Chem. Soc.* 95, 227 (1900)) hält die farblose für die trans-, die gelbe für die cis-Form.








Baal und Schulze das farbige, dem Diphensuccindan=dion=9.12 (II) entspricht.

Um die Frage zu prüfen, welche Aenderung die Farbe des trans- α , β -dibenzoyl-äthylens (V a) erleidet, wenn sich dessen Äthylenkohlenstoffatome mit den beiden Benzolringen unter Bildung von zwei kondensierten Indenon-Ringen verbinden, oder — was auf dasselbe herauskommt — wenn das Diphensuccindan=dion=9.12 (II) in das Diphensuccinden=10=dion=9.12 (X) übergeht, versuchte K. O. Müller⁸⁾ auf Veranlassung von K. Brand auf folgendem Wege zu diesem ungesättigten Ringdiketon zu gelangen:

Er wandelte Diphensuccindan=dion=9.12 (II) mit Phosphorpentachlorid in 9.9.12.12-Tetrachlordiphensuccindan (VI) um, das unter dem Einfluß von Natriumacetat außerordentlich leicht zwei Mol Chlornwasserstoff abgab und in 9.12-Dichlor-diphensuccindadien=9.11 (VII) überging. Dieses konnte durch Zinkstaub zum Diphensuccinden=10 (VIII) reduziert werden, das sich mit p-Nitroso-dimethyl-anilin nach dem Verfahren von P. Ehrlich und J. Sachs⁹⁾ zum Diphensuccinden=10=dion=9.12-di-(p-dimethylaminophenyl-imid) (IX) vereinigen ließ. Dieses lieferte bei der Spaltung mit verdünnter Salzsäure eine zinnoberrote Verbindung, und bei deren Elementaranalyse erhielt K. O. Müller für Kohlenstoff und Wasserstoff Werte, die auf das gesuchte Diphensuccinden=10=dion=9.12 (X) stimmten.

8) Diss. Gießen 1922.

9) B. 32, 2341 (1899); f. auch Sachs, B. 33, 959 (1900), B. 34, 118 (1901).



Auf Veranlassung von K. Brand hat dann später R. Fleischhauer¹⁰⁾ die rote, als Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X) angesprochene Verbindung einer abermaligen Untersuchung unterworfen. Er stellte fest, daß die Verbindung mit den üblichen Ketonreagentien Hydroxylamin und Phenylhydrazin nicht in normaler Weise reagiert; Fleischhauer erhielt zwar stickstoffhaltige Verbindungen, doch blieb deren Stickstoffgehalt erheblich selbst hinter dem des Monoxims und Monophenylhydrazons zurück. Diese geringe Neigung der für Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X) angesprochenen Verbindung, mit Hydroxylamin und mit Phenylhydrazin in normaler Weise zu reagieren, konnte ihren Grund in der eigenartigen Struktur des Diphenysuccindions oder aber auch in einer großen Unbeständigkeit der betreffenden Oxime und Phenylhydrazone haben. Hiergegen sprach allerdings, daß Fleischhauer nach der Methode von J. Sachs¹¹⁾ aus dem Diimid (IX) und Hydroxylaminchlorhydrat eine in dunkelviolettroten Blättchen kristallisierende Verbindung erhalten konnte, deren Stickstoff-, Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt auf das Diphenysuccinden=10=dion=dioxim=9.12 (XI) stimmte. Diese Verbindung ging bei der Einwirkung von Natriumnitrit und Eisessig in die von K. O. Müller erhaltene rote Verbindung über, der die mit dieser Reaktion durchaus in Einklang stehende Formel X zugesprochen worden war. Immerhin blieben noch genug ungeklärte Fragen übrig, die eine erneute Untersuchung der roten, für Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X) angesehenen Verbindung nötig erscheinen ließen. Aus diesem Grunde habe ich auf Veranlassung von Herrn Professor Dr. K. Brand

10) Diss. Gießen 1923.

11) Vgl. S. 6 Anm. 9.

die Untersuchung von Diphenysuccindan=dion=Abkömmlingen aufgenommen.

1. Teil. Ausgangsmaterial.

Bei der Gewinnung von Diphenysuccindan=dion=9.12 und der dafür erforderlichen Zwischenprodukte hielt ich mich im wesentlichen an die Angaben von Brand und seinen Mitarbeitern. Die hierbei von mir gemachten, noch nicht beschriebenen Beobachtungen sind im Versuchsteil angegeben.

2. Teil. 10=Brom=diphenysuccindan=dion=9.12 und die für Diphenysuccinden=10=dion=9.12 angesehene Verbindung.


Der eingehenden Untersuchung der roten Verbindung, die für Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X) gehalten wurde, stand im Wege, daß diese Verbindung bisher immer nur in recht geringer Menge erhalten werden konnte. Denn das Darstellungsverfahren, das von K. O. Müller auf Veranlassung von K. Brand in Anlehnung an die Methode von P. Ehrlich und J. Sachs ausgearbeitet wurde, ist nicht nur langwierig und zeitraubend, sondern auch mit recht erheblichen Materialverlusten verbunden. Es wurde damals gewählt, weil man nach den guten Erfahrungen, die P. Ehrlich und J. Sachs¹²⁾ sowie andere Forscher mit dieser Methode gemacht hatten, erwarten durfte, die gesuchte Verbindung sicher zu erhalten.

Schon Fleischhauer¹³⁾ hat Versuche in verschiedener Richtung unternommen, um in einfacher Weise zu dem gesuchten Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X) zu gelangen. Unter anderem versuchte er, Diphenysuccindan=dion=9.12 durch

12) B. 32, 2341 (1899).

13) Diss. Gießen 1923.

Erhitzen mit Schwefel (unter Anlehnung an die Mitteilungen von Vesterberg¹⁴⁾ und Ruzicka¹⁵⁾) zum Diphen-succindan-10=dion-9.12 zu dehydrieren:




Seinen Bemühungen blieb aber der Erfolg versagt.

Ich habe die Versuche von Fleischhauer wiederholt, erhielt aber ebenfalls beim Zusammenschmelzen von Diphen-succindan-10=dion-9.12 (II) mit Schwefel kein Diphen-succindan-10=dion-9.12 (X). Ersatz des Schwefels durch das von Diels und Mitarbeitern¹⁶⁾ empfohlene Selen führte ebenfalls nicht zum Ziel. Neben viel unverändertem Diphen-succindan-10=dion-9.12 und einem gelbroten Harze erhielt ich eine in kreßgelben Nadelchen kristallisierende Verbindung — allerdings in sehr geringer Menge —, die sich nach ihrem Schmelzpunkt und nach dem Mischschmelzpunkt als identisch erwies mit einer weiter unten beschriebenen Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI), und die wohl durch Mitwirkung von Luftsaauerstoff auf Diphen-succindan-10=dion entstanden ist:

14) B. 36, 4200 (1903).

15) C. 1921, III, 631; Helvet. chim. acta 4, 505; 5, 315, 345, 369, 531, 710, 913.

16) A. 459, 1 (1927); B. 60, 2323 (1927).



Allerdings gelang es mir nicht, die gleiche Verbindung durch Einwirkung von Luft allein auf schmelzendes Diphenysuccindion=9.12 darzustellen.


Folgender Weg führte zu der bisher für Diphenysuccindion=10=dion=9.12 (X) gehaltenen Verbindung.

Brom ist bei Ausschluß von Licht auf eine kochende Lösung von Diphenysuccindandion=9.12 in Tetrachlorkohlenstoff auch während einer mehrere Tage dauernden Einwirkung ohne Einfluß, aber es substituiert unter denselben Bedingungen unter dem Einfluß von Licht nicht nur das Wasserstoffatom des Diphenysuccindandions in 10=, sondern schließlich auch das in 11=Stellung; dabei entstehen 10=Brom=diphenysuccindandion=9.12 (XII) und 10.11=Dibrom=diphenysuccindandion=9.12 (XIII). Als Lichtquelle diente für meine Versuche eine Liliputbogenlampe von E. Leiß-Weßlar, und als Reaktionsgefäß ein Uviolglaskolben. Der Verlauf der Bromierung war unter scheinbar gleichen Versuchsbedingungen nicht immer der gleiche. Doch gelang es bisher nicht, hierfür die Gründe zu ermitteln. Die als Halogenüberträger bei anderen Substitutionsreaktionen bewährten Stoffe¹⁷⁾ erwiesen sich als einflußlos auf die Bromierung.


Zur Herstellung von 10=Brom=diphenysuccindandion=9.12 (XII) wurde auf ein Mol Diphenysuccindandion=9.12 (II) nicht mehr als ein Mol Brom angewandt, obgleich ein Teil des Broms und des Diphenysuccindandions stets unverändert blieb. Bei Anwendung eines großen Ueberschusses an Brom entsteht aber, neben 10=Brom=Diphenysuccindandion=9.12 (XII), in erheblicher Menge auch 10.11=Dibrom=diphenysuccindandion=9.12 (XIII), das sich viel schwerer von dem

17) S. 33.

10-Brom-diphen-succindan-dion-9.12 (XII) trennen läßt als unverändertes Diphen-succindan-dion-9.12 (II).



Aus dem 10-Brom-diphen-succindan-dion-9.12 (XII) sollte mit Hilfe von Natriumacetat Bromwasserstoff abgespalten und so das Diphen-succindan-dion-10-dion-9.12 (X) gewonnen werden.



Wurde die kochende Lösung von 10-Brom-diphen-succindan-dion-9.12 (XII) in Aethylalkohol mit Natriumacetat versetzt, so nahm die farblose Lösung sofort sattviolette Farbe

an; diese ging bei weiterem Kochen über Braun in Hellrot über. Schließlich schieden sich rote Kristalle ab, die nach dem Umkristallisieren denselben Schmelzpunkt 299° (korrigiert) zeigten wie die von K. O. Müller als Diphenysuccinden-10=dion-9.12 (X) beschriebene Verbindung. Ein Mischschmelzpunkt mit einem von K. O. Müller hergestellten Präparat lag ebenfalls bei 299° (korrigiert). Abspaltung von Bromwasserstoff und Bildung der roten Verbindung verliefen „quantitativ“.

Da zunächst kein Grund vorlag, die Richtigkeit der Müllerschen Analyseergebnisse anzuzweifeln, — denn die von Müller angewandte Darstellungsmethode der roten Verbindung vom $\text{F. P. } 299^{\circ}$ (korr.) erscheint für den gewünschten Zweck als durchaus geeignet — so glaubte auch ich in der roten Verbindung, die ich auf dem oben angeführten Wege erhielt, das gesuchte Diphenysuccinden-10=dion-9.12 (X) in den Händen zu haben. Erst in einem verhältnismäßig weit fortgeschrittenen Stadium der Arbeit, als alle meine Versuche, die rote Verbindung als Diphenysuccinden-10=dion-9.12 (X) zu charakterisieren, fehlschlügen und zu gänzlich unbrauchbaren Ergebnissen führten, wurden die Analysen von K. O. Müller nachgeprüft, sowie das Molekulargewicht der roten Verbindung bestimmt. Zunächst lieferte die Elementaranalyse Werte, die ebenfalls auf Diphenysuccinden-10=dion-9.12 stimmten, doch wurde bei der Analyse eine ganz ungewöhnlich schwere Verbrennbarkeit¹⁸⁾ der roten Verbindung festgestellt. Als dieser Eigenschaft Rechnung getragen wurde, ergab die Elementaranalyse dagegen Werte, die zusammen mit dem in Benzol und auch in Kampher gefundenen Molekulargewicht am besten auf

18) Diese schwere Verbrennbarkeit der roten Verbindung dürfte auch die Ursache sein für die zu niedrigen Werte, die Müller fand.

die Formeln $C_{31}H_{16}O_3$, $C_{32}H_{16}O_3$ und $C_{32}H_{14}O_3$ stimmen; die rote Verbindung enthält also viel mehr Kohlenstoff als das Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X).

$C_{31}H_{16}O_3$: C = 85,3 %; H = 3,7%; M = 436,13.

$C_{32}H_{16}O_3$: C = 86,08%; H = 3.1%; M = 446,11.

$C_{32}H_{14}O_3$: C = 85,69%, H = 3,6%; M = 448,13.

Gefunden:	C = 85,52	H = 4,50	M in Benzol:
	86,03	3,92	416, 450.
	86,27	3,5	M in Kampher:
	86,11	4,6	479, 449.
	85,96	3,88	
	85,14	3,94	
	85,40	4,07	

Eine Untersuchung des Müllerschen, als Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X) bezeichneten Präparats (das mit Rücksicht auf die nur geringe zur Verfügung stehende Menge nur einmal umkristallisiert werden konnte), ergab folgende Werte:


C = 85,0	H = 3,6	M in Kampher:
85,11	4,22	425, 413, 463,
		438, 432.

Es kann mithin keinem Zweifel unterliegen, daß die von mir aus 10-Brom=diphenysuccindan=dion=9.12 (XII) erhaltene rote Verbindung mit der von Müller aus dem Diphenysuccinden=10 (VIII) erhaltenen identisch ist. Aber beide sind kein Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X), sondern vielmehr ein und dasselbe Umwandlungsprodukt aus zwei Molekülen Diphenysuccinden=10=dion=9.12 (X).

Die Aufklärung der Konstitution der roten Verbindung war mir nicht mehr möglich, ist aber bereits von anderer Seite in Gang gesetzt worden¹⁹⁾. Daher lassen sich über die

¹⁹⁾ Privatmitteilung von Herrn Prof. Dr. Brand.

Bildungsweise der roten Verbindung auch nur Vermutungen anstellen, und die folgenden Umsetzungsgleichungen werden nur mit allem Vorbehalt wiedergegeben²⁰⁾:



Bei der durch die Gleichung 2 wiedergegebenen Reaktion würde es sich um eine intramolekulare Wasserstoffwanderung und intramolekulare Wasserabspaltung handeln. Die dritte Gleichung würde dagegen eine Reaktion wiedergeben, bei der aus zwei Molekülen Diphenysuccindien-10=dien-9.12 Sauerstoff abgespalten wurde, der in irgend einer Weise oxydierend wirkte.

Da die rote Verbindung die Ketonreaktionen nicht oder nur sehr mangelhaft gibt, dürften bei der Umwandlung des Diphenysuccindien-10=dien-9.12 in die rote Verbindung vom *J. P.* 299⁰ (korr.), dessen Ketonfunktionen entweder ganz verloren gegangen oder mindestens aber sehr stark zurückgedrängt worden sein.


Es gelang mir nicht, an die rote Verbindung vom *J. P.* 299⁰ (korr.) Brom anzulagern, und sie widerstand auch dem Einfluß des durch Palladium-Zinkoxyd erregten Wasserstoffs.

3. Teil. 10.11=Dibrom-diphenysuccindien=dien-9.12 und seine Umwandlungsverbindungen.

10.11=Dibromdiphenysuccindien=dien-9.12 (XIII) wurde am besten durch Einwirkung von Brom auf eine kochende

²⁰⁾ Ob es sich hier um ähnliche Reaktionen handelt, wie sie von Japp und Klingemann (*B.* 21, 2933, (1888); *B.* 22, 2880, (1889); *Chem. Soc.* 57, 662, (1889)) bei ungesättigten γ - Diketonen vom Typus des α , β - Dibenzoyläthans beobachtet wurden, wird die weitere Untersuchung ergeben.


Lösung von 10-Brom-diphen-succindan=dion-9.12 (XII) in Tetrachlorstoff erhalten und entsteht auch unmittelbar aus Diphen-succindan=dion-9.12 (II) und Brom im Bombenrohr bei 140–150°.



Während bei der Reduktion von 10.11-Dibrom-diphen-succindan=dion-9.12 mit Zinkstaub und Aethanol²¹⁾ — neben einer bei 340° schmelzenden Verbindung²²⁾ — Diphen-succindan=dion-9.12 (II) entstand, lieferte die Behandlung mit Magnesiumspänen und Aethanol die rote Verbindung vom *S. P.* 299°:

21) Das Brom wurde dabei „quantitativ“ in Ionenzustand übergeführt.


22) Diese Verbindung ist vielleicht identisch mit dem „Isodiphen-succindon“ von Rofer — *J. A.* 247, 154 (1888).



Dieselbe rote Verbindung entstand auch beim Kochen von 10.11-Dibrom-diphensuccindan-dion-9.12 mit Natriumjodid in Aceton oder Aethanol. Dabei ist beachtenswert, daß die Menge des in Freiheit gesetzten Jods nicht so groß war, wie nach der Gleichung

$2 \text{ C}_{16} \text{ H}_8 \text{ O}_2 \text{ Br}_2 + 4 \text{ NaJ} \longrightarrow 4 \text{ NaBr} + 2 \text{ C}_{16} \text{ H}_8 \text{ O}_2 24) + 2 \text{ J}_2$ zu erwarten war, sondern nur etwa halb so groß; allerdings war auch die rote Verbindung vom *J. P.* 299° (korrigiert) nicht das einzige Reaktionsprodukt, sondern es war auch noch eine andere Verbindung entstanden, deren Natur nicht erkannt werden konnte.

10-Brom-diphensuccindan-dion-9.12 (XII) lieferte bei der Einwirkung von Natriummethylat nur eine nicht zu identifizierende ölige Verbindung, dagegen gab 10.11-Dibrom-diphensuccindan-dion-9.12 (XIII) mit zwei Mol Natriummethylat (1 n-Lösung) eine Verbindung, deren Analyse und Verhalten auf ein Dimethoxy-diphensuccindan-dion (XIV) stimmten.




Die Verbindung sieht eigelb aus, enthält zwei Methoxylgruppen und gibt beim Kochen mit Chlornasserstoff nach

23) oder eine der anderen auf S. 15 angegebenen Umsetzungen.

24) In Form der roten Umwandlungsverbindung vom *J. P.* 299° (korrigiert).

Zeisel die weiter unten beschriebene kreßgelbe Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI) 25). Die eigelbe Farbe der Dimethoxyverbindung ist mit der Konstitution des 10.11-Dimethoxydiphenysuccindan-dions=9.12 nicht in Einklang zu bringen (XXIII), (f. S. 21).


Die Dimethoxyverbindung XIV spaltet ungewöhnlich leicht ihre beiden Methylgruppen ab, z. B. schon mit verdünnter Salzsäure. Dabei entsteht eine farblose Verbindung, deren Elementaranalyse auf ein Dioxydiphenysuccindan-dion (XV) stimmt. Die Dioxyverbindung verliert sehr leicht Wasser unter Uebergang in die weiter unten beschriebene Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI), löst sich in Alkalien mit brauner Farbe und bildet mit Diazomethan die eigelbe Dimethoxyverbindung (XIV) zurück.



Wirkte statt zwei Mol 1n-Natriummethylatlösung eine 3n-Natriummethylatlösung im Ueberschuß auf 10.11-Dibromdiphenysuccindan-dion=9.12 ein, so entstanden anstelle der eigelben Dimethoxyverbindung $C_{16}H_8O_2(OCH_3)_2$ (XIV) braunrote Kristalle des Natriumsalzes der Dioxyverbindung $C_{16}H_8O_2(OH)_2$ (XV, $(ONa)_2$ statt $(OH)_2$), der Zusammensetzung $C_{16}H_8O_4Na_2$.

Wird die eigelbe Dimethoxyverbindung (XIV) mit rauchender Salzsäure auf dem Wasserbade einige Zeit erwärmt, so spaltet sie die beiden Methylgruppen ab und geht in eine in schönen kreßgelben Nadelchen kristallisierende Verbindung über, deren Analyse und Molekulargewicht der Zusammensetzung eines Oxido-diphenysuccindan-dions (XIV) 25) entsprechen:

25) Eine andere Bildungsweise der Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ f. S. 10.










Diese Verbindung nimmt unter dem Einfluß von Schwefelsäure ein Molekül Wasser auf und geht in die oben bereits erwähnte Dioxyverbindung (XV) über. Von Alkali wird die Verbindung in der Kälte langsam, in der Hitze dagegen schneller mit braunroter Farbe aufgenommen, und die Lösung scheidet beim Ansäuern mit verdünnter Schwefelsäure ebenfalls die oben beschriebene Dioxyverbindung (XV) ab.

Von Diazomethan wird die Oxidoverbindung, im Gegensatz zu der Dioxyverbindung, nicht verändert, sie enthält mithin keine Hydroxylgruppen mehr.


Bei der Oxydation mit Chromsäureanhydrid in Eisessig lieferte die Oxidoverbindung eine Verbindung von der Zusammensetzung $\text{C}_{16}\text{H}_8\text{O}_4$ (XVII) $\text{Z. P. } 298,5^\circ$ (korr.), die weder mit Diphtalyl $\text{C}_{16}\text{H}_8\text{O}_4$ ($\text{Z. P. } 334^\circ$) noch mit Benzil-o-Karbonsäure $\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_5$ ($\text{Z. P. } 274^\circ$) identisch ist und sich in Laugen mit gelber Farbe löst. Von Perhydrol in Gegenwart von Natronlauge wurde die Oxidoverbindung dagegen zu Phthalsäure (XIII) abgebaut.

Jodwasserstoff reduzierte die Oxidoverbindung im Einschlußrohr bei $170-176^\circ$ zu einer Verbindung der Zusammensetzung $\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_2$ (XIX), die mit dem Diphenylsuccindandion=9.12 (II) isomer ist, aber nicht wie dieses bei 210° , sondern bei $177,5^\circ$ schmilzt und mit Phenylhydrazin nicht in Reaktion tritt.


Von Zinkstaub und Eisessig wurde die Oxidoverbindung dagegen in eine farblose Verbindung der Zusammensetzung $\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_3$ (XX) verwandelt, während Wasserstoff in Gegenwart von Zinkoxyd-Palladium ohne Einfluß auf die Oxidverbindung blieb.




Auffallend leicht reagiert die Oxidoverbindung mit Ammoniak und mit primären Aminen unter Bildung gelber Verbindungen, gemäß der Gleichung:



Auch mit o-Phenylendiamin reagiert die Oxidoverbindung unter Bildung einer in tiefroten Blättchen kristallisierenden Verbindung. Ob die Reaktion nach der Gleichung





oder aber nach der Gleichung



vor sich geht, konnte noch nicht ermittelt werden.

Die gleichen Verbindungen wie aus der Oxidoverbindung (XVI) und Ammoniak bezw. Anilin konnten auch aus dem 10.11-Dibrom-diphenylsuccindandion 9.12 mit Ammoniak bezw. Anilin — im letzten Falle aber nur in Gegenwart von Natriumacetat — erhalten werden:




Es ist bisher nicht möglich gewesen, einen einwandfreien Nachweis dafür zu erbringen, daß die aus dem 10.11-Dibrom-diphenylsuccindandion 9.12 (XIII) mit Natrium-methylat erhaltene eigelbe Verbindung (XIV) das 10.11-Dimethoxy-diphenylsuccindandion 9.12 von der Formel XXIII ist. Ihre eigelbe Farbe spricht eigentlich dagegen.

Ebenso wenig steht daher die Struktur der Dioxyverbindung (XV), der Oxidoverbindung (XVI) und der aus dieser erhaltenen Iminoverbindungen fest. In keinem Falle





gelang es bisher, mit Sicherheit nachzuweisen, daß in den genannten Verbindungen XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXIIa und b, der Diphenysuccindan-Ring wirklich noch vorhanden ist: aus keiner der genannten Verbindungen konnte durch Oxydation oder durch Reduktion eine Verbindung erhalten werden, deren Bildung unter den gewählten Bedingungen nur aus Diphenysuccindan-dion-Abkömmlingen möglich ist, wie Benzil-oo'-dikarbonsäure, Diphenysuccindan oder Diphenysuccindan-dion selbst. Der mit Perhydrol und Natronlauge erzielte Abbau der Oxidoverbindung (XVI) zur o-Phthalsäure (XVIII) spricht bestimmt nicht gegen das unveränderte Vorhandensein des Diphenysuccindan-dion-Ringsystems in der Oxidoverbindung, doch er schließt auch andere Möglichkeiten nicht aus, da Phthalsäure beim oxydativen Abbau gar vieler Ringverbindungen entsteht.

Für das 10.11-Dibrom-diphenysuccindan-dion-9.12 dürfte die durch die Formel XIII wiedergegebene Struktur wohl einwandfrei durch die Reduktion der Dibromverbindung zum Diphenysuccindan-dion-9.12 (II) gesichert sein. Nun liefert aber dieses 10.11-Dibrom-diphenysuccindan-dion-9.12 (XIII) unter recht milden Bedingungen sowohl mit Ammoniak wie auch mit Anilin dieselben Verbindungen, die mit den gleichen Aminen auch aus der Oxidoverbindung (XVI) erhalten werden. Will man mithin nicht die Annahme machen, daß aus dem 10.11-Dibrom-diphenysuccindan-dion-9.12 (XIII) und Ammoniak bezw. Anilin zunächst eine der Dimethoxyverbindung XIV analoge Diaminoverbindung unter gleichzeitiger Aenderung der Struktur des Diphenysuccindan-dion-Ringes entsteht, die dann Ammoniak bezw. Anilin abspaltet:



So muß man in den Ammoniak- und Anilinabkömmlingen der Oxidoverbindung XVI 10.11-Imino-diphen-succindan-dion-Derivate (XXVI) sehen.

Hieraus würde aber dann weiterhin zu folgern sein, daß die Oxidoverbindung (XVI) das 10.11-Oxido-diphen-succindan-dion-9.12 (XXV), die Dioxyverbindung (XV) das 10.11-Dioxy-diphen-succindan-dion-9.12 (XXIV), und die Dimethoxyverbindung (XIV) das 10.11-Dimethoxy-diphen-succindan-dion-9.12 (XXIII) ist.



Solange es jedoch nicht gelungen ist, einwandfrei in den genannten Verbindungen den Diphenysuccindan=dion=Ring nachzuweisen, solange muß auch damit gerechnet werden, daß bei der Einwirkung von Natriummethylat auf 10.11=Dibrom=diphenysuccindan=dion=9.12, dessen Struktur eine tiefgreifende Wandlung erlitten hat. Welcher Art die gegebenenfalls erfolgten Strukturänderungen sind, darüber können erst bestimmte Aussagen gemacht werden, wenn wohldefinierte Abbauprodukte vorliegen.

Ebenso muß erst die endgültige Aufklärung der Struktur der neugewonnenen Verbindungen abgewartet werden, ehe in Erörterung über die Ursache für deren Farbe eingetreten werden kann.

Versuchsteil.

1. Teil. Ausgangsmaterial.

Darstellung von Benzylcyanid $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CN$ ²⁶⁾.

300 ccm Benzylchlorid und 300 ccm Aethylalkohol wurden auf dem Heiztrichter am Rückflußkühler mit einer Lösung von 180 g Kaliumcyanid in 200 ccm heißem Wasser vier Stunden lang gekocht. Die Farbe des Gemisches verwandelte sich langsam von Gelb über Kreßrot in Tiefbraun. Nach Beendigung der Umsetzung wurde die obere Schicht abgehoben und zur Abtrennung der letzten Reste der Kaliumchloridlösung mit Aether versetzt. Der nach dem Abdestil-

26) Mann. B. 14, 1645 (1881).

lieren des Aethers und Alkohols zurückbleibende Rückstand wurde mit Chlorkalzium getrocknet und rektifiziert. Für die weitere Verarbeitung wurde der zwischen 220 und 240° übergehende Anteil aufgefangen, aus dem sich bei mehrtägigem Stehen farblose Kristalle absetzten²⁷⁾. Von diesen wurde abfiltriert und das Filtrat weiter auf Phenylzimmtäurenitril verarbeitet.

Ausbeute an Benzylcyanid vom K. P. 220 – 240°: 80%. Reines Benzylcyanid kocht bei 232°.

Der Vorlauf wurde bei einer neuen Benzylcyanid-Darstellung mitverwendet.

Darstellung von Phenylzimmtäurenitril²⁸⁾.



Die Mischung von 100 g = 95,3 ccm Benzylcyanid und 95 g = 91,3 ccm Benzaldehyd wurde in einer Porzellanschale langsam unter gutem Umrühren mit einer Lösung von 4 g Natrium in 70 ccm absolutem Alkohol versetzt. Die nach Zugabe der Natriumalkoholatlösung zunächst ausgeschiedene feste Masse ging unter Selbsterwärmen wieder in Lösung und erstarrte beim Erkalten vollkommen. Sie wurde mit kaltem Wasser verrieben, abgesaugt, getrocknet und fein gepulvert.


Das rohe Phenylzimmtäurenitril (Ausbeute 90%) wurde ohne weitere Reinigung auf Diphenylbernsteinsäurenitril verarbeitet. Reines Phenylzimmtäurenitril schmilzt bei 86°.

27) Nach dem Trocknen schmolzen die Kristalle bei 230°. Misch-
P. mit Diphenylbernsteinsäurenitril: 216°.

28) H. O. Müller, Diss. Gießen 1923.

W. Elbs, Diss. Gießen 1924.

Darstellung von Diphenylbernsteinsäurenitril²⁹⁾.



Zu der auf dem Heiztrichter am Rückflußkühler kochenden Lösung von 100 g Phenylzimtsäurenitril in 200 ccm Aethylalkohol wurde eine Lösung von 40 g Kaliumcyanid in 70 ccm heißem Wasser langsam hinzugegeben. Nach kurzer Zeit schied sich ein gelbbraunes, sandiges Pulver ab. Die nach einhalbstündigem Kochen braungefärbte Reaktionsflüssigkeit wurde mit einer heißgesättigten wässrigen Lösung von 70 g Ammoniumchlorid versetzt, noch eine Vierteltunde lang im Sieden erhalten und schließlich noch heiß vorsichtig (Abzug) mit konzentrierter Salzsäure schwach angesäuert.


Das ausgeschiedene gelbbraune Diphenylbernsteinsäurenitril, das noch Phenylzimtsäurenitril enthielt, wurde abgesaugt, auf der Nutsche mit heißem Wasser gut ausgewaschen und nochmals in der Joeben beschriebenen Weise mit Alkohol, 40 g Kaliumcyanid, 70 g Ammoniumchlorid und konzentrierter Salzsäure behandelt. So wurde ein Diphenylbernsteinsäurenitril erhalten, das nach dem Absaugen, Auswaschen mit Wasser und Auskochen mit Aethylalkohol ein schneeweißes grobkristallines Pulver bildete und sich fast ohne jede Harzbildung mit Schwefelsäure verseifen ließ.

Ausbeute an Diphenylbernsteinsäurenitril 80%. J. P. (nach dem Umkristallisieren) 230°.

29) K. O. Müller, Diss. Gießen 1923.

W. Elbs, Diss. Gießen 1954.

Darstellung von Diphenylbernsteinsäure³⁰⁾.




80 g des in der soeben beschriebenen Weise dargestellten Diphenylbernsteinsäurenitrils wurden mit einem Gemisch aus 120 ccm konz. Schwefelsäure und 80 ccm Wasser auf dem Heiztrichter am Rückflußkühler zwei Stunden lang gekocht. Der noch heiß in eine Porzellanschale gegossene Kolbeninhalt lieferte beim Erkalten einen festen, aber bröckeligen Kuchen von Diphenylbernsteinsäure, von dem die Schwefelsäure Flüssigkeit ohne Schwierigkeit abgegossen werden konnte. Die zurückgebliebene rohe Diphenylbernsteinsäure wurde mit Wasser verrieben, abgesaugt, mit Wasser ausgewaschen und in heißer 30%iger Natronlauge gelöst. Die heiße Lösung wurde von den in geringer Menge abgeschiedenen Harzflocken abgegossen und noch heiß vorsichtig unter Umrühren mit konz. Salzsäure angesäuert. Die ausgefallene, schneeweiße Diphenylbernsteinsäure wurde abgesaugt, mit kaltem Wasser gewaschen und gut getrocknet. Ausbeute 98%.

Reine Diphenylbernsteinsäure schmilzt bei 229°.

30) H. O. Müller, Diss. Gießen 1923.

W. Elbs, Diss. Gießen 1924.

Darstellung von Diphenylsuccindan-dion-9.12.31).



10 g trockene, feingepulverte Diphenylbernsteinsäure wurden in 100 ccm auf 130° erwärmter, konz. Schwefelsäure unter Umrühren eben gelöst und die Lösung sofort in 100 ccm kaltes Wasser vorsichtig eingegossen. Die Mischung wurde nach dem Erkalten mit Wasser verdünnt und das ausgeschiedene Diphenylsuccindan-dion abgesaugt, mit Wasser gut ausgewaschen, getrocknet und aus siedendem Tetrachlorkohlenstoff umkristallisiert. Die Ausbeute betrug bis zu 46 %.

Diphenylsuccindan-dion-9.12 kristallisiert aus Tetrachlorkohlenstoff, aus Alkohol und aus Benzol in großen Oktaedern, aus Eisessig in schuppenförmigen Nadeln vom *f. P.* 210,7° (korr.). 100 ccm kochender Tetrachlorkohlenstoff nehmen $\frac{100 \cdot 4,7}{140} = 3,36$ g, 100 ccm kochendes Aethanol $\frac{100 \cdot 5,8}{300} = 1,93$ g Diphenylsuccindan-dion auf. Ueber den Schmelzpunkt erhitzt, sublimiert Diphenylsuccindan-dion in langen verfilzten Nadeln.

31) H. O. Müller, Diss. Gießen 1923.

W. Elbs, Diss. Gießen 1924.

2. Teil. 10-Brom-diphenysuccindan=dion=9.12 und die für Diphenysuccinden=10=dion=9.12 angesehene Verbindung.

Versuche zur Dehydrierung von Diphenysuccindan=dion=9.12 mit Schwefel³²⁾ und mit Selen³³⁾.

1 g feingepulvertes Diphenysuccindan=dion=9.12 wurde mit 0,5 g (etwas mehr als der für Abspaltung von zwei Wasserstoffatomen nötigen Menge) Selen gemischt und allmählich im Metallbade auf 380° (Thermometer im Bade) erhitzt. Die Mischung schmolz bei 157°, begann bei etwa 200° an der Reagensglaswand hinaufzukriechen und gab bei etwa 270° in geringer Menge ein kreßgelbes Sublimat unter gleichzeitiger Bildung von wenig Selenwasserstoff. Schmelze und Sublimat von mehreren Versuchen wurden, in jedem Falle für sich, mit Essigester ausgekocht.

Die Schmelze lieferte eine schwarze unlösliche Schlacke und eine gelbrote Lösung; aus dieser wurde unverändertes Diphenysuccindan=dion (Z. P. 210°) erhalten und ein gelbrotes Harz, das bisher nicht zum Kristallisieren gebracht werden konnte.

Die vereinigten Lösungen der Sublimate von mehreren Versuchen (aus etwa 10 g Diphenysuccindan=dion) lieferten in geringer Menge verfilzte, feine kreßgelbe Nadelchen, die nach wiederholtem Umkristallisieren aus kochendem Methanol bei 255° uncorr., 264,5° corr. schmolzen und frei von Selen waren. Ihre Menge reichte zu einer Analyse nicht aus, doch konnte durch den Misch-Schmelzpunkt fest-

32) Fleischhauer, Diss. Gießen 1923.

33) Diels, A. 459, 1 (1927); B. 60, 2323 (1927).

gestellt werden, daß sie mit der auf S. 46 ff. beschriebenen Oxidoverbindung (Formel XVI) identisch waren.

Ersatz des Selens durch Schwefel änderte das Versuchsergebnis nicht wesentlich, doch konnten die bei 255° schmelzenden kreßgelben Nadelchen in diesem Falle nicht erhalten werden. Ebenso erfolglos waren die in Gegenwart von Bleioxyd vorgenommenen Versuche: in keinem Falle konnte Diphensuccindan=dion=9.12 unter den Reaktionsprodukten nachgewiesen werden.


Schwefelwasserstoff brachte weder in einer Benzollösung noch in einer Schmelze des Diphensuccindan=dions eine Veränderung des Ketons hervor.

Behandlung von Diphensuccindan=dion=9.12
mit Luft bei 250–300°.

1,17 g (= 0,005 Mol) Diphensuccindan=dion=9.12 wurden in einem geeigneten Reagensglas im Metallbad auf 250 bis 300° erhitzt; durch die Schmelze wurde zwei Stunden lang Luft geleitet, die durch konz. Schwefelsäure getrocknet war. Dabei wurde 0,14 g Sublimat aus unverändertem Diphensuccindan=dion=9.12 und einer rotgelben Verbindung erhalten, und gleichzeitig schied sich in einer vorgelegten, mit trockenem Tetrachlorkohlenstoff beschickten Waschflasche Wasser ab. Die Schmelze besaß nach Beendigung des Versuches braune Farbe.

Schmelze und Sublimat wurden getrennt aus Essigester umkristallisiert. Aus der Lösung der Schmelze konnte nur ein brauner, kohligter Schlamm erhalten werden. Die Lösung des Sublimats lieferte Diphensuccindan=dion vom *S. P.* 210° neben sehr wenig kreßgelben Nadeln, deren *S. P.* wegen ihrer geringen Menge nicht bestimmt werden konnte.

Darstellung von 10-Brom-diphen-succindan-dion-9.12



In einem, mit Rückflußkühler versehenen Uviolglas-
kolben von 250 ccm Inhalt wurden 4,7 g (= 0,02 Mol)
Diphen-succindan-dion mit 120 ccm Tetrachlorkohlenstoff auf
dem Wasserbade zum Sieden erhitzt; dabei ging der größte
Teil des Ketons in Lösung. Der Kolbeninhalt wurde mit
einer Lösung von 3,18 g (= 0,02 Mol) Brom in Tetrachlor-
kohlenstoff (21 ccm einer Lösung von 5,07 ccm = 15,98 g
Brom in 100 ccm Tetrachlorkohlenstoff) versetzt und der
Rückflußkühler durch Stopfen und Glasrohr mit einer Wasch-
flasche verbunden, die Kalilauge enthielt (zur Aufnahme
von Bromwasserstoff und Bromdämpfen).

Das im Sieden erhaltene Reaktionsgemisch wurde eine
Stunde lang durch eine Liliputbogenlampe (von E. Leitz-
Wetzlar) belichtet; dabei blaßte die braunrote Lösung deutlich
ab und entwickelte Bromwasserstoff. Die klare Reaktions-
flüssigkeit hinterließ nach dem Abdestillieren des Broms und
des Tetrachlorkohlenstoffs einen rotbraunen, zähflüssigen
Rückstand, der nach dem Auskochen mit 25 ccm Methanol
zu einem gelblichweißen Brei erstarrte. Dieser lieferte beim
Kochen mit 75 ccm Methanol eine Lösung, die beim Er-
kalten durchschnittlich 4 g (= 64,5%) 10-Brom-diphen-succ-
indan-dion-9.12 in weißen, länglichen, oft zu Drusen ver-
einigten Blättchen abschied. Für die Darstellung der roten
Verbindung vom F. P. 299° kann dieses Brom-diphen-
succindan-dion ohne weitere Reinigung verwendet werden.

Nach mehrmaligem Umkristallisieren aus kochendem Methanol bildet das 10-Brom-diphenylsuccindan=dion=9.12 farblose, bei längerem Liegen allmählich sich gelblich färbende längliche Blättchen, die häufig zu Drusen vereinigt sind und bei $147,2^{\circ}$ (korr.) schmelzen.

0,2075 g,	0,1051 g,	7,045 mg,	6,489 mg	Subst.:
0,0943 g,	0,0604 g,	4,265 mg,	3,905 mg	AgBr.
		3,837 mg,	2,919 mg	Subst.:
		8,630 mg,	6,575 mg	CO ₂ ,
		1,075 mg,	0,835 mg	H ₂ O.

$C_{16}H_9O_2Br$ (312,99).

Ber.: C 61,34 H 2,9 Br 25,53.

Gef.:	61,3	3,1	25,6;	24,9;
	61,4	3,2	25,8;	25,6.

10-Brom-diphenylsuccindan=dion=9.12 löst sich in kochendem Eisessig, Essigester, Aethanol, Methanol (8 g in 100 ccm), Tetrachlorkohlenstoff verhältnismäßig leicht, in kochendem Benzol (50 g in 100 ccm) sehr leicht, und es ist fast unlöslich in Petroläther (K. P. etwa 50°). Beim Erhitzen auf $200-250^{\circ}$ spaltet Brom-Diphenylsuccindan=dion Bromwasserstoff ab und geht in die weiter unten beschriebene rote Verbindung vom F. P. 299° über. Dieselbe Erscheinung spielt sich auch bei der Verbrennung der Verbindung ab.

Bei den ersten Versuchen dieser Reihe wurde die mit Brom versetzte Lösung von Diphenylsuccindan=dion unter den oben beschriebenen Versuchsbedingungen, obwohl ein Kolben aus gewöhnlichem Glase verwendet wurde, unter dem Einfluß des Lichts der Filiputbogenlampe bereits innerhalb von 15 Minuten fast farblos, ohne daß nennenswerte Mengen von Bromdämpfen durch den Rückfluß=

kühler entweichen. Diese günstigen Versuchsergebnisse ließen sich später trotz Wechsels der Bedingungen — Anwendung von sorgfältig gereinigtem Brom und Tetrachlorkohlenstoff, Ersatz von Tetrachlorkohlenstoff durch Schwefelkohlenstoff und Belichtung mit Sonnenlicht, Zusatz von rotem Phosphor, Schwefel, Chlor, Jod, Eisen oder Quecksilber-2-chlorid — nicht wieder erreichen.

Es empfiehlt sich bei der Darstellung von 10-Brom-diphenylsuccindan-dion-9.12 nicht, einen Ueberschuß von Brom anzuwenden, denn dann entsteht nebenher 10.11-Dibrom-diphenylsuccindan-dion-9.12, dessen Trennung vom 10-Brom-diphenylsuccindan-dion-9.12 schwerer durchzuführen ist als die von noch unverändertem Diphenylsuccindan-dion-9.12.

Brom wirkt auf Diphenylsuccindan-dion bei der Siedetemperatur des Tetrachlorkohlenstoffs nur unter dem Einfluß von Licht in merklichem Umfange ein, und zwar scheint das Licht der Bogenlampe günstigere Ergebnisse zu haben als Sonnenlicht. Ohne Belichtung konnte auch nach tagelangem Kochen von Diphenylsuccindan-dion und Brom in Tetrachlorkohlenstoff eine merkliche Umsetzung nicht beobachtet werden.

Darstellung der roten, bisher für „Diphenylsuccindan-10-dion-9.12“ gehaltenen Verbindung aus 10-Brom-diphenylsuccindan-dion-9.12.

3,1 g (= 0,01 Mol) reines 10-Brom-diphenylsuccindan-dion-9.12 wurden in 50 ccm siedendem Aethanol gelöst und die Lösung mit 0,82 g (= 0,01 Mol) geschmolzenem Natriumacetat eine halbe Stunde lang auf dem Wasserbade am Rückflußkühler gekocht. Sofort nach Zugabe des Natriumacetats nahm die ursprünglich farblose Lösung tiefviolette

Farbe an, die dann in Braun und zuletzt in Hellrot übergang, und ließ nun kleine, gut ausgebildete rote Kristalle fallen. Diese wurden nach dem Erkalten der Reaktionsflüssigkeit abgesaugt, mit Alkohol gewaschen und über Chlorkalzium getrocknet. Sie waren sofort rein und zeigten den $\text{Z. P. } 286^{\circ}$ (unkorr.) Die Ausbeute war nahezu quantitativ. Für die Analyse wurde die Verbindung aus siedendem Essigester umkristallisiert und in roten Kristallen vom $\text{Z. P. } 299^{\circ}$ (korr.) erhalten. Misch-Schmelzpunkt mit einem auf Veranlassung von K. Brand von K. O. Müller³⁴⁾ (aus Diphenylsuccinden=10, VIII, mit Hilfe von p-Nitroso-dimethylanilin) dargestellten Präparat: $299,0^{\circ}$ (korr.)

Ver.: $\text{C}_{16}\text{H}_8\text{O}_2$ (232,06) 82,7% C 3,5% H
(X)

$\text{C}_{31}\text{H}_{16}\text{O}_3$ (436,13) 85,3% C 3,7% H

$\text{C}_{32}\text{H}_{16}\text{O}_3$ (446,11) 86,08% C 3,1% H

$\text{C}_{32}\text{H}_{14}\text{O}_3$ (448,13) 85,69% C 3,6% H

Gef.: Elementaranalysen:

Subst.:	CO_2 :	H_2O :	% C:	% H:
4,130 mg	12,950 mg	1,660 mg	85,52	4,50
0,1166 g *)	0,3678 g	0,0408 g	86,03	3,92
0,0747 g **)	0,2363 g	0,0235 g	86,27	3,5
0,0400 g **)	0,1263 g	0,0164 g	86,11	4,6
0,0389 mg	0,1226 g	0,0135 g	85,96	3,88
3,807 mg	11,885 mg	1,340 mg	85,14	3,94
3,144 mg	9,845 mg	1,145 mg	85,40	4,07

*) bei 100° , 15 mm getrocknet.

**) eine halbe Stunde bei $130\text{--}140^{\circ}$, 15 mm getrocknet.

34) (S. 6).

Präparat Müller: 34)

0,0406 g	0,1267 g	0,0153 g	85,11	4,22
4,681 mg	14,590 mg	1,510 mg	85,00	3,61

(Gef.) Bestimmungen des Molekulargewichts:

0,1716 g Kampher	20,58 g Benzol	20,58 g Benzol
0,0154 g Subst.	0,1733 g Subst.	0,2071 g Subst.

$$\Delta = 7,5^{\circ}$$

$$M = 479$$

$$\Delta = 0,107^{\circ}$$

$$M = 416$$

$$\Delta = 0,115^{\circ}$$

$$M = 450$$

$$\Delta = 8^{\circ}$$

$$M = 449$$

Präparat Müller:

0,0714 g Kampher	0,0729 g Kampher
------------------	------------------

0,0129 g Subst.	0,0059 g Subst.
-----------------	-----------------

$$\Delta = 17^{\circ}$$

$$M = 425$$

$$\Delta = 7^{\circ}$$

$$M = 463$$

$$\Delta = 17,5^{\circ}$$

$$M = 413$$

$$\Delta = 7,4^{\circ}$$

$$M = 438$$

$$\Delta = 7,5^{\circ}$$

$$M = 432$$

Die Verbindung ist leicht löslich in siedendem Benzol, Toluol, Benzin (K. P. etwa 65°) und Chloroform, mäßig löslich in siedendem Aether, Pyridin, Dioxan, Aethylacetat und Aceton. Es nehmen auf je 100 ccm von siedendem: Tetrachlorkohlenstoff 1,7 g, Eisessig 2,5 g, Butylacetat 1,8 g und Aethanol 0,05 g der Verbindung.

Für die Darstellung der Verbindung kann auch das rohe 10-Brom-diphenysuccindan-dion benutzt werden; doch muß in diesem Falle die Reaktionsflüssigkeit noch siedend heiß von der ausgeschiedenen roten Verbindung abgesaugt werden, um diese frei von Diphenysuccindan-dion und 10.11-Dibrom-diphenysuccindan-dion zu erhalten.

34) (S. 6).

Versuche zur katalytischen Hydrierung der roten Verbindung vom F. P. 299°.

a) In einer Schüttelente wurden 1 g Zinkoxyd und 10 ccm 0,2%ige Palladium=2=chlorid=Lösung durch einen lebhaften Wasserstoffstrom reduziert³⁵⁾, zu dieser Aufschlammung, ohne den Wasserstoffstrom zu unterbrechen, eine Lösung von 1,16 g der roten Verbindung in 90 ccm reinem Dioxan unter Vermeidung von Luftzutritt gegeben und die Ente mit einer Wasserstoffbürette verbunden. Das Gemisch wurde 7 Stunden lang bei Raumtemperatur mit Wasserstoff geschüttelt, danach wurde der Katalysator abfiltriert. Das Filtrat hinterließ nach Abdestillieren des größten Teils von Dioxan eine kreßrote Lösung, aus der sich die rote Verbindung unverändert abschied; F. P. 299°.

b) Derselbe Versuch wurde bei 56–58° durchgeführt, er hatte dasselbe Ergebnis: die rote Verbindung vom F. P. 299° blieb unverändert.

Versuche zur Bromierung der roten Verbindung vom F. P. 299°.

a) 0,12 g der roten Verbindung wurden mit 0,15 g Brom und einem Tropfen Tetrachlorkohlenstoff im Einschlußrohr fünf Stunden lang auf 140–145° erhitzt. Danach war ein ziegelbraunroter Bodensatz entstanden, der in Aceton aufgenommen wurde. Beim Verdunsten des Acetons blieb ein bromhaltiges Pulver zurück, das unscharf bei etwa 260° schmolz, und aus dem das gesuchte 10.11=Dibrom=diphenylsuccindan=dion=9.12 nicht zu erhalten war.


b) Die Lösung von 1,2 g der roten Verbindung in 87 ccm siedendem Tetrachlorkohlenstoff wurde nach Zusatz

35) J. D. Krücke, Diss. Marburg 1932.

von 0,8 g (= 0,005 Mol) Brom drei Wochen lang bei Raumtemperatur in einem verschlossenen Kolben dem Sonnenlicht ausgesetzt. Die rotbraune Lösung schied in dieser Zeit die rote Verbindung nicht wieder ab, war aber hell kreßgellb geworden, und in dem Kolben befanden sich Bromwasserstoffdämpfe. Nach dem Abdestillieren des Tetrachlorkohlenstoffs, der farblos überging, blieb ein ziegelrotes Pulver zurück, das in siedendem Methanol gelöst wurde. Die Lösung lieferte beim fraktionierten Einengen drei Abscheidungen (0,14 g; 0,26 g; 0,94 g), die alle bei $190-210^{\circ}$ unscharf schmolzen, bromhaltig waren, und aus denen durch fraktionierte Kristallisation 10.11-Dibromdiphensuccindandion nicht erhalten werden konnte.

3. Teil. 10.11-Dibromdiphensuccindandion-9.12 und seine Umwandlungsverbindungen.

Darstellung von 10.11-Dibrom-diphensuccindandion-9.12. (XIII)



a) Die kochende Lösung von 6,2 g (= 0,02 Mol) 10-Bromdiphensuccindandion-9.12 (XII) in 140 ccm Tetrachlorkohlenstoff wurde in den beim 10-Bromdiphensuccindandion beschriebenen Uviolglaskolben mit 9 ccm = 27 g Brom versetzt und die Mischung unter dauerndem Sieden 12 Stunden lang mit der Liliputbogenlampe belichtet. Darauf wurden unverbrauchtes Brom und Tetrachlorkohlen-

stoff abdestilliert und der braune, zähflüssige Rückstand aus 50 ccm kochendem Essigester umkristallisiert. Es wurden 3,9 g (= 50%) 10.11-Dibrom-diphenysuccindan=dion in farblosen Kristallen erhalten. Durch Zusatz von Eisen, rotem Phosphor, Schwefel, Jod oder Quecksilber=2-chlorid wurde die Ausbeute an Dibrom-diphenysuccindan=dion nicht erhöht.

Nach mehrmaligem Umkristallisieren aus kochendem Essigester wurde das 10.11-Dibrom-Diphenysuccindan=dion in farblosen Kristallen vom *S.* P. 215,0 (korr.) erhalten. Es löst sich in kochendem Eisessig, Tetrachlorkohlenstoff und Aceton verhältnismäßig leicht; 100 ccm siedender Essigester nehmen 5 g, 100 ccm siedendes Methanol 0,8 g, 100 ccm siedendes Aethanol 1 g der Verbindung auf.

0,1991 g, 4,769 mg, 4,639 mg Subst.:

0,1893 g, 4,550 mg, 4,440 mg AgBr

3,379 mg 3,200 mg Subst.:

6,085 mg 5,785 mg CO₂,

0,685 mg 0,665 mg H₂O

C₁₆H₈O₂Br₂ (391,90)

Ber.: C 48,99 H 2,1 Br 40,8

Gef.: 49,1 2,3 40,5

 49,3 2,3 40,6 40,4

Dibrom-diphenysuccindan=dion geht in Essigesterlösung unter dem Einfluß von Licht allmählich in die Oxidoverbindung C₁₆H₈O₂>O (XVI) über (*s.* S. 48).

Die beim Umkristallisieren des rohen Dibrom-diphenysuccindan=dions anfallende Mutterlauge hinterließ nach dem restlosen Abdestillieren des Essigesters einen mit Kristallen durchsetzten schmierigen Rückstand. Die Kristalle, von denen eine Probe aus dem Magma isoliert wurde, schmolzen bei 140° und gaben beim Kochen mit einer alkoholischen Lösung

von Natriumacetat die rote Verbindung vom F. P. 299° (korr.), sie bestanden also aus unverändertem 10-Brom-diphen-succindan-dion.

Der schmierige Rückstand, der 10-Brom-diphen-succindandion enthielt, wurde wieder in Tetrachlorkohlenstoff aufgenommen und lieferte, in der oben beschriebenen Weise bromiert, eine neue Menge von Dibrom-diphen-succindan-dion. Nach dreimaliger Wiederholung der Bromierung blieb schließlich eine nicht kristallisierende schmierige Masse von stechendem Geruch zurück. Sie wurde in kochendem Alkohol gelöst und mit etwas mehr als der berechneten Menge Natriumacetat am Rückflußkühler gekocht. Dabei entstanden aus 25 g vereinigten Bromierungsrückständen etwa 11,2 g der roten Verbindung vom F. P. 299° .

b) 0,12 g (= 0,0005 Mol) fein zerriebenes Diphen-succindan-dion wurden mit 0,3 g (= etwa 0,002 Mol) Brom und einem Tropfen Tetrachlorkohlenstoff in der Bombe fünf Stunden lang auf $140-150^{\circ}$ erhitzt. Es wurden so 0,18 g kleine Kristalle erhalten, die nach dem Trocknen bei $215,0^{\circ}$ (korr.) schmolzen und sich als reines 10.11-Dibrom-diphen-succindan-dion-9.12 (XIII) erwiesen.

Reduktion von 10.11-Dibrom-diphen-succindan-dion-9.12.

a) mit Zinkstaub. Die Lösung von 1,30 g 10.11-Dibrom-diphen-succindan-dion (XIII) in 120 ccm siedendem Aethanol wurde mit 1 g Zinkstaub 7 bis 8 Stunden lang am Rückflußkühler gekocht. Dabei nahm die anfangs ganz schwach gelbliche Lösung kräftig gelbe Farbe an. Der nach dem vollkommenen Abdestillieren des Alkohols auf dem Wasserbade erhaltene trockene Rückstand wurde mit Wasser ausgekocht, die gelbrote wässrige Lösung

abfiltriert und das Ungelöste gut mit heißem Wasser auf dem Filter ausgewaschen. Alle Operationen wurden möglichst quantitativ durchgeführt und die gesammelten Filtrate nach dem Zusatz von Salpetersäure (wobei sie farblos wurden, aber klar blieben), mit einer wässrigen Lösung von 1 g Silbernitrat gefällt. Das abgesaugte, gewaschene und getrocknete Silberbromid wog 1,211 g, entsprechend 0,515 g Brom. Da 1,30 g Dibrom=diphen succindan=dion 0,53 g Brom enthält, so war mithin das Brom durch Zinkstaub „quantitativ“ abgespalten worden.

Der beim Auskochen mit Wasser ungelöst gebliebene, zinkhaltige Rückstand wurde mit 30 ccm siedendem Essigester ausgezogen. Aus dem erhaltenen Filtrat konnten drei nacheinander sich ausscheidende Kristallisationen abgetrennt werden, die sämtlich halogenfrei waren: 1. Kristallisation: feine weiße Nadelchen vom *J. P.* 340° (unkorr.). (Sintern begann bei 260°); 2. Kristallisation (erst nach mehrestündigem Stehen): große weiße Kristalle von Diphen succindan=dion (II), *J. P.* 210°, Misch-Schmelzpunkt mit reinem Diphen succindan=dion 210°; 3. Kristallisation (nach mehreren Tagen): feine weiße Nadelchen vom *J. P.* etwa 320 (Sintern begann bei 200). Die Bildung der roten Verbindung vom *J. P.* 299° wurde nicht beobachtet.

b) mit Magnesium. 0,65 g (= 0,0017 Mol) Dibrom=diphen succindan=dion (XIII) wurden in 65 ccm Äthanol mit 1,64 g (= 0,0133 Mol) Magnesiumspänen 6 Stunden lang gekocht. In der rotgelben Flüssigkeit befand sich danach ein weißer, wohl aus Magnesiumsalz bestehender Niederschlag, der mit kleinen roten Kristallen durchsetzt war. Die herausgeloßenen Kristalle hatten den Schmelzpunkt 299° (korr.).

c) mit Natriumjodid und Aceton. Die Lösung von 0,65 g (= 0,0017 Mol) Dibrom=diphenysuccindan=dion (XIII) in 60 ccm heißem Aceton wurde mit 0,5 g (= 0,0033 Mol) Natriumjodid versetzt und zwei Stunden lang gekocht. Die Lösung nahm nach dem Hinzugeben von Natriumjodid sofort braune Farbe an. Nach mehrstündigem Stehen schied die gekochte Lösung keine Kristalle ab, auch dann nicht, als die Lösung nach Zugabe von 1 g Natriumjodid noch eine Zeitlang gekocht worden war. Erst auf Zusatz von 190 ccm Wasser schied die erkaltete Lösung feine rote Kristalle neben einem hellrotbraunen, mulfmigen, sandigen Pulver ab. Die ausgelesenen roten Kristalle schmolzen bei 299° (korr.).

Die Mutterlauge wurde vom Niederschlag abfiltriert, mit Wasser versetzt, und das abgespaltene Jod mit n/10-Natriumthiosulfat-Lösung titriert; der gefundene Wert entsprach nur 0,14 g Brom, anstatt, wie berechnet, 0,29 g Brom.

d) mit Natriumjodid in Aethanol. Der oben beschriebene Versuch wurde in der gleichen Weise mit einer Lösung von 0,75 g Dibrom=diphenysuccindan=dion in 75 ccm Aethanol ausgeführt; dabei kristallisierte die gebildete rote Verbindung schon ohne Zusatz von Wasser aus (Z. P. 299° korr.). Der bei der Titration des abgespaltenen Jods erhaltene Wert entsprach, statt 0,31 g, nur 0,18 g Brom.

Einwirkung von Natriummethylat auf 10-Brom-diphenysuccindan=dion=9.12 (XII).

a) Die heiße Lösung von 1,04 g (= 0,0033 Mol) 10-Brom=diphenysuccindan=dion (XII) in 50 ccm Methanol wurde mit 3,34 ccm n. Natriummethylat-methanol-Lösung

versezt. Beim Zusammentreffen der beiden Lösungen trat zunächst tiefviolette, dann tiefbraune Farbe auf, die sich bei mehrstündigem Stehen wieder aufhellte. Da die Reaktionsflüssigkeit einen Niederschlag nicht abschied, wurde sie in zwei Teile geteilt und diese folgendermaßen behandelt:

Die eine Hälfte wurde mit der doppelten Menge Wasser vermischt. Darauf entstand zunächst eine milchige Trübung, die sich allmählich unter Abscheidung kreßgelber Tropfen wieder klärte. Die öligen Tropfen lösten sich beim Erwärmen der Flüssigkeit, schieden sich aber beim Erkalten wieder ab und wurden weder im Kühlschrank (-6°) noch in einer Kältemischung (-12°) fest.

Die Flüssigkeit wurde ausgeäthert; der Aetherauszug hinterließ beim Abdunsten des Aethers eine gelblichbraune Schmiere, die sich in siedendem Petroläther vom K. P. 40° löste, aber beim Erkalten keine Kristalle gab, sondern sich wieder schmierig abschied. Durch Kochen mit rauchender Salzsäure konnte eine definierbare Verbindung nicht erhalten werden.

Die andere Hälfte der Lösung wurde unter vermindertem Druck in Exsiccator eingedunstet, der Rückstand mit wenig Benzol ausgezogen und das erhaltene Filtrat mit Petroläther (K. P. 40°) versezt. Auch hier fielen nur wenige schmierige Flocken aus.

b) 0,52 g (= 0,0017 Mol) 10-Brom-diphenylsuccindandion (XII) wurden nach dem Aufschlännen in 1 ccm Methanol mit 1,67 ccm n-Natriummethylat-methanol-Lösung versezt. Die Mischung nahm sofort tiefbraune Farbe an, und nach kurzer Zeit ging das gesamte Brom-diphenylsuccindandion unter gleichzeitiger Aufhellung der Flüssigkeitsfarbe in Lösung. Die mit Wasser versezte Lösung gab

beim Ausäthern einen schmierigen Rückstand, der sich gegen Benzol und Petroläther wie das unter a) beschriebene Reaktionsprodukt verhielt.

Darstellung der Dimethoxyverbindung
 $C_{16}H_{18}O_2 (OCH_3)_2$ (XIV, XXIII) aus 10.11-Dibromdiphen-succindan-dion-9.12 (XIII).

Die heiße Lösung von 1,96 g (= 0,005 Mol) 10.11-Dibromdiphen-succindan-dion in 250 ccm Methanol wurde mit 10 ccm n-Natriummethylat-methanol-Lösung versetzt; dabei wurde eine tiefgelbe Lösung erhalten. Die noch heiße Flüssigkeit wurde allmählich mit 800 ccm Wasser versetzt; sie trübte sich bereits, als 250 ccm Wasser zugegeben worden waren. Nach mehrstündigem Stehen in der Kälte schied sich die Dimethoxy-Verbindung in feinen, zu einem Filz vereinigten eigelben Nadeln ab. Sie wurden abgesaugt, mit Wasser gewaschen und über Chlorkalzium getrocknet und waren fast rein. *F. P.* 117°. Ausbeute 1,2 g = 81,6%.

Die Verbindung kristallisiert aus siedendem 50%igem wässrigen Methanol in langen eigelben Nadelchen, aus konz. Benzol-Lösung nach Zugabe von Petroläther (*K. P.* 40°) in goldgelben Oktaedern vom *F. P.* 119,8° (korr.) Sie ist sehr leicht löslich in Aethanol, Methanol, Chloroform, Benzol und Eisessig, schwerer löslich in Petroläther und sehr wenig löslich in Wasser.

4,090 mg	4,115 mg Subst.:
11,090 mg	11,145 mg CO ₂ ,
1,770 mg	1,825 mg H ₂ O
0,0516 g	0,0516 g Subst. ergaben nach Zeisel:
0,0852 g	0,0832 g Ag J

$C_{16}H_8O_2(OCH_3)_2$ (294,1)

Ber.:	C 73,4	H 4,8	—OCH ₃	21,1
Gef.:	73,9	4,8		21,8
	73,9	4,96		21,3

Die Verbindung spaltete bei der Zeisel-Bestimmung die Methyl-Gruppen außerordentlich schnell ab. In dem Zeiselskölbchen verblieben jeweils 0,04 g (ber. 0,047 g) der Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI) in feinen krefßgelben Nadelchen (f. S. 47).

Darstellung der Dioxy-Verbindung $C_{16}H_8O_2(OH)_2$ (XV, XXIV)-

Die erwärmte Lösung von 0,1 g der Dimethoxyverbindung (XIV) in 10 ccm Methanol wurde mit 15 ccm warmem Wasser und dann mit 25 ccm 12,5% iger Salzsäure in zwei Gaben versetzt und eine halbe Minute im siedenden Wasserbad erwärmt, bis die Farbe schwach grünlich-gelb geworden war. Die danach sofort mit 85 ccm kaltem Wasser versetzte und mit fließendem Wasser gut gekühlte Flüssigkeit schied nach einigen Minuten einen gelblichen Niederschlag ab, der abgesaugt und getrocknet wurde. Rohausbeute 0,08 g = 88%.

Die Herstellung der Dioxy-Verbindung gelingt leichter und bequemer in der auf S. 48 beschriebenen Weise aus der Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI).

Die Reinigung der Dioxy-Verbindung ist in jedem Falle schwierig, da sie sich in den meisten organischen Flüssigkeiten sehr leicht löst und starke Neigung zeigt, unter Wasserabspaltung in die Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI) überzugehen. Wird die Dioxy-Verbindung in sehr wenig Methanol durch ganz kurzes Aufsieden gelöst und die Lösung sofort stark abgekühlt, so scheidet sich die Ver-

bindung in feinen farblosen, fettig glänzenden Blättchen ab. Diese fließen bei etwa 155° zu einer kreßgelben Schmelze zusammen, die bei langsamem Weitererhitzen wieder erstarrt und bei 255° (unkorr.) wieder flüssig wird. (Die Oxido-Verbindung schmilzt bei 257° uncorr., $264,5^{\circ}$ korr.; J. S. 48). — Aus Methanol wurde die Dioxy-Verbindung ein einziges Mal in farblosen Körnchen, sonst stets in Blättchen erhalten.

3,325 mg 2,685 mg Subst.:

8,790 mg 7,105 mg CO_2

1,315 mg 1,085 mg H_2O

$\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_4$ (266,08) Ber.: C 72,7 H 3,05

Gef.: 72,1 4,4

72,1 4,5

Der zu hohe Wasserstoffwert und der zu niedrige Kohlenstoffwert finden ihre Erklärung darin, daß sich die Verbindung ohne teilweise Anhydrierung nicht trocknen läßt.

Die Dioxy-Verbindung löst sich leicht in fast allen organischen Flüssigkeiten und ist auch in Wasser etwas löslich. Schon Spuren rufen in alkalischen Flüssigkeiten braune Farbe hervor. Mit Diazomethan wird die Verbindung zur Dimethoxy-Verbindung $\text{C}_{16}\text{H}_8\text{O}_2 (\text{OCH}_3)_2$ (XIV) methyliert.

Methylierung der Dioxy-Verbindung $\text{C}_{16}\text{H}_8\text{O}_2 (\text{OH})_2$ (XV)

0,01 g der Dioxy-Verbindung (XV) wurde in 1,5 ccm Chloroform gelöst und mit einer Lösung von 0,01 bis 0,02 g Diazomethan in 1,5 ccm Aether versetzt. Die farblose Lösung wurde unter Stickstoffentwicklung sofort tiefgelb.

Nach einigen Stunden wurden die Lösungsmittel auf dem Wasserbade abgedampft und der gelbe lackartige Rückstand aus heißem 50%igem wässrigem Methanol umkristallisiert. Es wurde so die oben beschriebene Dimethoxy-Verbindung (XIV) in eigelben feinen Nadeln vom *F. P.* 119,8° (korr.) (Misch-Schmelzpunkt 119,8° korr.) erhalten.

Natriumsalz der Dioxy-Verbindung $C_{16}H_8O_2(OH)_2$
(XV)

1,3 g (= 0,0033 Mol) 10.11-Dibrom-diphenylsuccindandion (XIII) wurden mit 20 ccm einer etwa 3 n-Natrium-methylat-Lösung unter allmählichem Zusatz von 10 ccm absolutem Methanol eine Stunde lang gekocht. Die tiefbraunrot gewordene Lösung setzte Kristalle ab, die stark hygroskopisch waren und Natrium enthielten.

Zur Analyse wurden die Kristalle nach dem Abgießen der Mutterlauge mit absolutem Aether abgewaschen, dann (um den Zutritt von feuchter Luft zu verhindern) mit absolutem Aether schnell in ein tariertes Wägegläschen gespült, im Vakuumexsiccator getrocknet und gewogen. Darauf wurden sie vorsichtig in einen tarierten Porzellantiegel übergeführt, das Wägegläschen mit konz. Schwefelsäure sorgfältig nachgespült, und die Substanz in der üblichen Weise (Zusatz von Ammoniumkarbonat) zu Natriumsulfat abgeraucht.

0,1251 g Subst. ergab 0,0546 g Na_2SO_4

$C_{16}H_8O_4Na_2$ (310,06) Ber: Na 14,8

Gef.: 14,1

Darstellung der Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$
(XVI, XXV)

1,47 g (= 0,005 Mol) der Dimethoxy-Verbindung (XIV) wurden mit 20 ccm rauchender Salzsäure eine halbe Stunde lang auf dem Wasserbade erhitzt; dabei entstanden kreßgelbe Nadeln. Gelegentlich nimmt man hierbei wahr, daß die feinen eigelben Nadeln der Dimethoxy-Verbindung zunächst zerfallen und vorübergehend farblos werden (Zwischenbildung der Dioxy-Verbindung (XV)?) Nach Zusatz von etwa 80 ccm Wasser wurden die entstandenen kreßgelben Nadeln abgesaugt, mit Wasser gewaschen und über Chlorkalzium getrocknet. Ausbeute an sofort reiner Oxido-Verbindung nahezu quantitativ. *J. P.* 264,5° (korr.).

4,962 mg Subst. 2,674 mg Subst.

14,015 mg CO₂, 7,645 mg CO₂,

1,54 mg H₂O, 0,910 mg H₂O

0,0543 g Kampfer 0,0616 g Kampfer 20,47 g Benzol

0,0045 g Subst. 0,0066 g Subst. 0,0854 g Subst.

$\Delta = 14^\circ$ $\Delta = 17^\circ$ $\Delta = 0,09^\circ$

M = 237 M = 252 M = 242

$C_{16}H_8O_2$ (248,06) Ber.: C 77,4 H 3,3

Gef.: 77,03 3,5
 77,97 3,8

Die Oxido-Verbindung löst sich mäßig in siedendem Aether, Aethanol, Methanol (0,24 g in 100 ccm), leichter in siedendem Eisessig, (3,72 g in 100 ccm). Von kalter konz. Schwefelsäure wird sie mit grünstichiger brauner Farbe aufgenommen und scheidet sich aus dieser Lösung auf Zusatz von Wasser zum größten Teil unverändert wieder aus; das klare schwefelsaure Filtrat ließ allmählich

Nadelchen der Dioxy-Verbindung $C_{16}H_8O_2(OH)_2$ (XV) (Umwandlungspunkt 155° , J. S. 45) fallen.

Ueber die Bildung der Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ aus Diphensuccindan=dion beim Schmelzen mit Selen J. S. 29, aus 10.11=Dibrom=diphensuccindan=dion unter dem Einfluß von Licht J. S. 38, aus der Dioxy-Verbindung $C_{16}H_8O_2(OH)_2$ beim Schmelzen J. S. 45, (aus dem Diphensuccindan=dion unter dem Einfluß von Luft? J. S. 30).

Der Niederschlag, der beim Kochen einer aus 1,3 g Dibrom=diphensuccindan=dion mit 20 ccm 3n=Natrium=methylat=Lösung erhaltenen Lösung mit rauchender Salzsäure sich abgeschieden hatte, wurde mit kaltem Aether ausgezogen und der Aetherauszug vom Aether befreit. Beim Umkristallisieren des Rückstandes aus heißem Methanol wurde schließlich auch eine Fraktion von 0,02 g weißen verfilzten Nadeln vom F. P. 352° (unkorr.) erhalten.

Umwandlung der Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI) in die Dioxy-Verbindung $C_{16}H_8O_2(OH)_2$ (XV) durch Alkali.

Die Oxido-Verbindung (XVI) löst sich langsam in der Kälte, etwas schneller beim Erwärmen in Alkalilauge zu dem Alkalisalz der Dioxy-Verbindung (XV); die Dioxy-Verbindung läßt sich daher auf diesem Wege bequem darstellen (J. S. 44).

0,3 g der Oxido-Verbindung wurden in 10 ccm 10%iger Natronlauge durch einhalbstündiges Erwärmen auf dem Wasserbade gelöst. Die filtrierte, rotbraune Lösung wurde mit verdünnter Schwefelsäure angesäuert, der ent-

stehende Niederschlag abgesaugt und getrocknet. Umwandlungspunkt 155° (J. S. 45), Ausbeute 0,28 g = 78%.

Zur Reinigung wurde die Dioxy-Verbindung aus wenig siedendem Methanol umkristallisiert.

Verhalten der Oxido-Verbindung (XVI) gegen Diazomethan.

Die Lösung von 0,1 g der Oxido-Verbindung (XVI) in einer warmen Mischung aus 100 ccm Aether und 70 ccm Methanol wurde mit einigen ccm einer ätherischen Diazomethan-Lösung versetzt. Nach zwölfstündigem Stehen der Mischung, an der eine Veränderung nicht zu beobachten war, wurden die Lösungsmittel abdestilliert. Es verblieb ein unangenehm riechender gelber Rückstand (J. P. 180 bis 200°), der nach dem Umkristallisieren aus siedendem Aether bei $254-255^{\circ}$ schmolz und nach nochmaligem Umkristallisieren aus Methanol die feinen kreßgelben Nadeln der Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ vom J. P. $264,5^{\circ}$ (korr.) lieferte.

Oxydation der Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI) mit Chromsäureanhydrid.

Die heiße Lösung von 0,37 g (= 0,0015 Mol) der Oxido-Verbindung in 40 ccm siedendem Eisessig wurde mit 0,3 g (= 0,003 Mol) Chromsäureanhydrid eine Stunde lang gekocht. Die grün gewordene Lösung schied nach dem Erkalten bei mehrstündigem Stehen 0,17 g fettig glänzende, weiße Blättchen ab, die zunächst zwischen 278 und 282° und nach dem Umkristallisieren aus 30 ccm siedendem Eisessig bei $298,5^{\circ}$ (korr.) scharf schmolzen.

3,312 mg	3,559 mg Subst.:	
8,885 mg	9,475 mg CO ₂ ,	
0,995 mg	1,085 mg H ₂ O	
C ₁₆ H ₈ O ₄ (264,06)	Ber.: C 72,7	H 3,0
(XVII)	Gef: 72,9	3,4
	72,6	3,4

Bei der Analyse sublimierte das Oxydationsprodukt bei niedriger Temperatur und verbrannte, ohne zu schmelzen und ohne Kohle zu bilden.

Ein Misch-Schmelzpunkt des Oxydationsproduktes vom F. P. 298,5° mit Diphtalyl (F. P. 335°) lag bei 250° (unscharf), ein Misch-Schmelzpunkt mit Benzil=oo'-dikarbon=säure (F. P. 274° korr.) lag bei 271°.

Mit Natronlauge gab das Oxydationsprodukt langsam eine gelbe Lösung, die beim Kochen und auch beim mehrstündigem Stehen an der Luft farblos wurde.

Oxydation der Oxido-Verbindung C₁₆H₈O₂>O (XVI) mit Perhydrol.

Die rotbraune klare Lösung von 0,37 g (= 0,0015 Mol) der Oxido-Verbindung in 5 ccm Aethanol und 1 ccm 30%iger Natronlauge wurde langsam mit 14 ccm Perhydrol in kleinen Gaben versetzt. Die stark schäumende Flüssigkeit erwärmte sich beträchtlich und mußte durch fließendes Wasser gekühlt werden. Nach einigen Stunden hatte die Sauerstoffentwicklung aufgehört. Die hell kreisgelbe Reaktionsflüssigkeit wurde mit 5 ccm 12,5%iger Salzsäure angesäuert und blieb dabei farblos. Die saure Flüssigkeit wurde ausgeäthert.

Der Aetherauszug hinterließ nach dem Abdunsten des Aethers 0,33 g eines ganz schwach gelblichen Pulvers vom F. P. 198–200°, das nach dem Umkrystallisieren aus

kochendem Wasser bei 210° (korr.) schmolz und mit o-Phthalsäure (vom F. P. 213°) den Misch-F. P. 210° (korr.) zeigte (XVIII). Eine Probe gab ein Sublimat von langen glänzenden Nadeln, die für sich und im Gemisch mit Phthalsäureanhydrid bei 128° schmolzen.

Mit Resorcin und Chlorzink erhitzt, zeigte die erhaltene Säure die Fluoresceïn-Reaktion.

Reduktion der Oxido-Verbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI)
mit Jodwasserstoffsäure.

0,83 g (= 0,0033 Mol) der Oxido-Verbindung wurden mit 0,2 g rotem Phosphor und 6 ccm Jodwasserstoffsäure (d 1,7) im Einschlußrohr 7 Stunden lang auf etwa 170° erhitzt (nicht über 176° , da sich sonst eine an Asphalt erinnernde Masse bildete).

Der Röhreninhalt, der zum Teil aus farblosen Schüppchen bestand, wurde nach Zusatz einer zur Bindung des Jods gerade ausreichenden Natriumbisulfit-Menge der Wasserdampfdestillation unterworfen; diese wurde abgebrochen, als ein Liter Destillat übergegangen war. Dem Destillat, das wenige weißliche Flocken enthielt, konnte mit Aether eine anscheinend mit gelbem Öl behaftete, kaum wägbare Masse entzogen werden, deren eigenartiger Geruch an den von Orangen, vielleicht auch an den von Kokosfett erinnerte.

Die im Kolben zurückgebliebene, nach dem Erkalten wieder erstarrte gelbbraune Schmelze (0,85 g) lieferte nach mehrmaligem Umkristallisieren aus siedendem Eisessig fast farblose kurze Nadelchen mit grünstichigem Ton, die bei $177,5^{\circ}$ (korr.) schmolzen. Misch-Schmelzpunkt mit Diphenylsuccindandion (aus Eisessig, F. P. 210°): $150-160^{\circ}$.

2,415 mg	2,638 mg	Subst.:
7,290 mg	7,930 mg	CO ₂ ,
0,950 mg	1,015 mg	H ₂ O
C ₁₆ H ₁₀ O ₂ (234,08)	Ber.: C 82,1	H 4,3
(XIX)	Gef.: 82,0	4,4
	82,0	4,3

Eine Molekulargewichtsbestimmung nach Raft konnte nicht ausgeführt werden, da sich die Substanz in geschmolzenem Kampher anscheinend verändert und keinen eindeutigen Schmelzpunkt erkennen läßt.

Die Verbindung wurde von Kalifauge bei längerem Kochen unter tiefgreifender Veränderung mit olivgrüner Farbe aufgenommen. Kalte konzentrierte Schwefelsäure nimmt sie mit hellgrüner Fluoreszenz auf, die allmählich grünblau, dann blau wird, und die schließlich verschwindet, wenn die Lösung feuchter Luft ausgesetzt wird. Beim Verdünnen mit Wasser scheidet die Lösung in konzentrierter Schwefelsäure die ursprüngliche Substanz wieder aus.

Beim Kochen der Verbindung mit Eisessig und Phenylhydrazin wurde statt eines Hydrazons das Acetylphenylhydrazin vom *f. P.* 128° erhalten.

Reduktion der Oxido-Verbindung C₁₆H₈O₂>O (XVI)
mit Zinkstaub und Eisessig.

Die heiße Lösung von 0,93 g der Oxido-Verbindung in 10 ccm Eisessig wurde mit einer Messerspitze voll Zinkstaub aufgeköcht; dabei verlor sie ihre Farbe. Sie wurde noch heiß abgesaugt, auf 5 ccm eingengt und mit 5 ccm heißem Wasser versetzt. Die nach dem Erkalten trübe Flüssigkeit schied beim Stehen 0,14 g eines Niederschlags ab, der abgesaugt und aus Alkohol oder Eisessig

umkristallisiert, farblose Blättchen vom *J. P.* 187,5° korr. ergab.

Misch-Schmelzpunkt mit dem Reduktionsprodukt der Oxido-Verbindung und Jodwasserstoff (XIX) (177°): 154°.

Die gleiche Verbindung entsteht auch, wenn man die Oxido-Verbindung in alkoholischer Lösung mit Zinkstaub und einigen Tropfen Eisessig kocht.

2,434 mg	2,092 mg	Subst.:
6,800 mg	5,845 mg	CO ₂ ,
0,920 mg	0,785 mg	H ₂ O
C ₁₆ H ₁₀ O ₃ (250,08)	Ber.: C 76,8	H 4,0
(XX)	Gef.: 76,2	4,2
	76,2	4,2

Eine Molekulargewichtsbestimmung nach Raft konnte nicht ausgeführt werden, da die Substanz sich in Schmelzen dem Kampher zersetzt. Die Verbindung lieferte weder beim Kochen mit Ameisensäure noch mit Eisessig, Essigsäureanhydrid oder rauchender Salzsäure Diphenylsuccindien-10-dion oder die rote Verbindung vom *J. P.* 299°. Die Verbindung gab mit kalter konzentrierter Schwefelsäure eine gelbgrüne Lösung, die auf Zusatz von Essigsäureanhydrid farblos wurde und auf Zusatz von Wasser einen gelblichen Niederschlag fallen ließ.

Versuch zur katalytischen Hydrierung der Oxido-Verbindung C₁₆H₈O₂>O (XVI).

Die Lösung von 0,74 g (= 0,003 Mol) der Oxido-Verbindung in 100 ccm gereinigtem Dioxan wurde in der oben (S. 36) angegebenen Weise mit Zinkoxyd-Palladium-Katalysator unter Wasserstoff geschüttelt, und zwar zunächst zwei Stunden lang bei Raumtemperatur und dann fünf

Stunden lang bei 75°. Die vom Katalysator abfiltrierte Lösung lieferte beim Abdestillieren des Dioxans die Oxidoverbindung vom *J. P.* 264,5 (korr.) unverändert zurück.

Einwirkung von Ammoniak und primären Aminen auf die Oxidoverbindung $C_{16}H_8O_2 > O$ (XVI) und auf das 10.11-Dibrom-diphenylsuccindan=dion=9.12. (XIII).

1a) Oxido-Verbindung und Ammoniak.

In die heiße Lösung von 0,37 g (= 0,0015 Mol) der Oxidoverbindung in 100 ccm Äthanol wurde bis zum Erkalten der Lösung trockenes Ammoniakgas eingeleitet. Es fiel allmählich ein hellkarminroter Niederschlag aus, der nach dem Absaugen, Auswaschen und Trocknen über konzentrierter Schwefelsäure tiefkreßgelbe Farbe annahm. Ausbeute 0,24 g = 64,8% *J. P.* roh 366°.

Die Verbindung löst sich in Methanol, Äthanol, Amylalkohol, Essigester, Butylacetat, Benzol sehr schwer, in Tetrachlorkohlenstoff fast gar nicht. 100 ccm Dioxan nehmen beim Sieden 0,24 g, bei Raumtemperatur 0,07 g der Verbindung auf; sie fällt aus siedender Dioxanlösung beim Erkalten als gelbrotes kristallines Pulver vom *J. P.* 370° (unkorr.) aus.

3,525 mg	3,50 mg Subst.	5,332 mg Subst.
10,130 mg	10,065 mg CO ₂ ,	0,262 ccm N ₂
1,230 mg	1,250 mg H ₂ O	bei 764 mm, 23°

C ₁₆ H ₉ O ₂ N (247,08)	Ber.: C 77,7	H 3,7	N 5,7
(XXI, XXVI)	Gef.: 78,4	3,9	5,7
	78,4	4,0	

Kochende, rauchende oder methyllalkoholische Salzsäure ließen die Verbindung unverändert.

1 b) Dibrom=diphensuccindan=dion und Ammoniak.

Die gleiche Verbindung wurde aus dem 10.11=Dibrom=diphensuccindan=dion=9.12 (XIII) folgendermaßen erhalten:

In die heiße Lösung von 0,39 g (= 0,001 Mol) Dibrom=diphensuccindan=dion in 60 ccm Methanol wurde trockenes Ammoniakgas bis zum Erkalten der Lösung eingeleitet. Die Lösung färbte sich dabei sofort rot, und allmählich fiel ein schwammig=wattiger, rosaroter Niederschlag aus, der nach dem Absaugen und Trocknen über konzentrierter Schwefelsäure tiefkreßgelbe Farbe annahm. Ausbeute 0,25 g = 89%. *J. P.* 370° (unkorr.) ohne vorhergehendes Umkristallisieren. Misch=Schmelzpunkt mit der aus Ammoniak und der Oxido=Verbindung erhaltenen Verbindung: 370° (unkorr.).

2 a) Oxido=Verbindung und Anilin.

α) Die heiße Lösung von 0,37 g (= 0,0015 Mol) der Oxido=Verbindung in 120 ccm Aethanol wurde mit 5,6 ccm Anilin eine halbe Stunde lang auf dem Wasserbad am Rückflußkühler gekocht; dabei wurde sie tief erdbeerrot.

Da bei längerem Stehen im Eisschrank Kristallisation nicht erfolgte, wurde die Lösung auf etwa 60 ccm eingengt. Sie schied nun beim Erkalten 0,33 g (= 68,1%) tief erdbeerroten Nadelchen vom *J. P.* 245,5° ab. Aus der abgesaugten Mutterlauge konnte durch Einengen auch nach Zusatz von Wasser eine weitere Menge der Verbindung nicht erhalten werden.

Die Verbindung ist in den meisten organischen Flüssigkeiten mäßig löslich. 100 ccm Aethylalkohol nehmen bei Siedetemperatur 0,63 g, bei Raumtemperatur 0,12 g auf.

Die durch Umkristallisieren aus heißem Aethylalkohol erhaltenen tiefroten Nadelchen haben den *J. P.* 248,5° (korr). 4,229 mg Subst. gaben 0,148 mg N₂ bei 762 mm, 22°. C₂₂H₁₃O₂N (323,11) Ber.: N 4,3 Gef.: 4,1.
(XXI, XXVI)

Eine Molekulargewichtsbestimmung nach Raft konnte nicht ausgeführt werden, da sich die Verbindung in schmelzendem Kampher verändert.

β) Die aufgekochte Lösung von 0,37 g (= 0,0015 Mol) der Oxido-Verbindung in 2,8 ccm Anilin schied nach dem Erkalten und mehrstündigem Stehen einen dunkelroten kristallinen Niederschlag aus. Er wurde nach dem Abgießen des Anilins mit 10 ccm Aethanol verrieben, abgesaugt, mit 10 ccm Aethanol ausgewaschen, drei Stunden im Vakuum über Schwefelsäure und dann eine halbe Stunde bei 100° getrocknet. Ausbeute 0,38 g = 77,6%. *J. P.* 240° (unkorr.), nach dem Umkristallisieren aus Aethanol 268,5° (korr.).

2 b) Dibrom=diphenysuccindan=dion und Anilin.

Die gleiche Verbindung entstand auch aus dem 10.11=Dibrom=diphenysuccindan=dion=9.12 (XIII) und Anilin folgendermaßen:

Die Lösung von 0,19 g Dibrom=diphenysuccindan=dion in 30 ccm heißem Methanol wurde mit 2,8 ccm Anilin zwei Stunden lang auf dem Wasserbad am Rückflußkühler gekocht; dabei nahm sie rotbraune Farbe an. Da sie danach auch beim Stehen im Eisschrank und nach Animpfen mit der oben beschriebenen Verbindung keine Abscheidung ergab, wurde sie noch eine Stunde lang mit 0,6 g geschmolzenem Natriumacetat gekocht. Sie schied dann bei mehrstündigem Aufbewahren im Eisschrank 0,09 g = 55,7%

der oben beschriebenen roten Verbindung vom *F.* P. 248° ab, die nach dem Umkristallisieren aus siedendem Aethanol bei 248,5° (korr.) schmolzen. Misch-Schmelzpunkt mit dem nach 2 a α) dargestellten Anilinderivat: 248,5° (korr.).

3) Oxido-Verbindung und p-Toluidin.

Die Lösung von (0,37 g = 0,0015 Mol) der Oxido-Verbindung in 120 ccm heißem Aethanol wurde mit 1 g p-Toluidin eine Stunde lang auf dem Wasserbad am Rückflußkühler gekocht. Nach dem Erkalten schieden sich feine rote Nadelchen aus, die abgesaugt, mit Alkohol gewaschen und über Chlorkalzium getrocknet wurden. Ausbeute 0,27 g = 57,9%. Nach dem Umkristallisieren aus siedendem Aethanol, das in 100 ccm 0,11 g aufnimmt, wurde die Verbindung in feinen roten Nadelchen vom *F.* P. 287,9° (korr.) erhalten.

5,206 mg Subst. gaben 0,181 ccm N₂ bei 762 mm, 23,5°
C₂₈H₁₅O₂N (337,13) Ber.: N 4,2 Gef.: N 4,0
(XXI, XVI).

4) Oxido-Verbindung und p-Phenetidin.

Die Lösung von 0,37 g (= 0,0015 Mol) der Oxido-Verbindung in 120 ccm heißem Aethanol wurde mit 2,1 g p-Phenetidin eineinhalb Stunden lang auf dem Wasserbade am Rückflußkühler gekocht. Die Lösung färbte sich sofort rot und schied nach dem Einengen auf 20 ccm 0,32 g gelbrote Kristalle (Ausbeute = 58,1%) ab, die nach dem Absaugen, Auswaschen und Trocknen über Chlorkalzium bei 247,0° (korr.) schmolzen. 100 ccm siedendes Aethanol nahmen 0,23 g der Verbindung auf; durch das Umkristallisieren aus Aethanol änderte sich der Schmelzpunkt nicht mehr. 5,780 mg Subst. gaben 0,193 ccm N₂ bei 764 mm, 23°
C₂₄H₁₇O₂N (367,15) Ber.: N 3,8 Gef.: N 3,9.
(XXI, XXVI).

5. Oxido-Verbindung und o-Phenylen-diamin.

Die Lösung von 0,37 g (= 0,0015 Mol) der Oxido-Verbindung in 9 ccm heißem Eisessig wurde nach Zusatz von 0,32 g (= 0,003 Mol) o-Phenylen-diamin eine Viertelstunde lang im Paraffinbad am Rückflußkühler gekocht. Schon nach wenigen Minuten schieden sich aus der tiefrotbraun gewordenen Lösung rote Kristalle aus, die sich beim Erkalten der Lösung vermehrten. Sie wurden abgesaugt und zeigten nach dem Auswaschen mit Eisessig und Trocknen den Z. P. 276 und 278°. Ausbeute 0,37 g = 72,98%. Nach zweimaligem Umkristallisieren aus siedendem Eisessig bildete die Verbindung lange schmale Blättchen von tiefroter Farbe und dem Z. P. 289° (korr.). Sie ist in den meisten organischen Lösungsmitteln schwer löslich.

4,471 mg	3,819 mg Subst.:
0,312 ccm	0,274 ccm N ₂ bei
767 mm, 23°	763 mm, 22°

C ₂₂ H ₁₄ O ₂ N ₂ (338,13)	Ber.: N 8,3	Gef.: 8,4
(XXII)		8,3.

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. K. Brand, sage ich für die reichen Lehren und Anregungen, die ich von ihm empfangen durfte, und für die wohlwollende Förderung dieser Arbeit ergebenen Dank.

Lebenslauf.

Am 5. Februar 1904 wurde ich zu Chemnitz als Sohn des damaligen Oberpostpraktikanten Otto Gabel geboren.

Von Ostern 1910 bis Ostern 1912 besuchte ich die Städtische Vorschule für die Höheren Lehranstalten zu Erfurt, von Ostern 1912 bis Ostern 1913 die erste Vorschulklasse des Fürstlichen Gymnasiums zu Gera, von Ostern 1912 bis Ostern 1922 das Fürstliche Gymnasium zu Gera und bestand am 15. März 1922 an dieser Anstalt die Reifeprüfung unter Befreiung von der mündlichen Prüfung.

Vom 3. April 1922 bis 25. September 1922 arbeitete ich als Ingenieurlehrling in einer Maschinenfabrik in Gera. — An der Technischen Hochschule Karlsruhe studierte ich im W. H. 1922/23 Elektrotechnik und vom S. H. 1923 bis einschl. S. H. 1924 Chemie.

Vom S. H. 1925 bis einschl. S. H. 1927 studierte ich an der Universität München Chemie, nahm im Universitäts-Institut für Pharmazeutische und Lebensmittel-Chemie am Chemischen Praktikum teil und bestand am 12. Mai 1927 die erste Verbandsprüfung. Vom Februar 1926 bis August 1927 war ich Hilfsassistent in der Analytischen Ausgabe des Instituts.

Vom W. H. 1927/28 bis einschl. W. H. 1928/29 studierte ich an der Universität Gießen Chemie, nahm im Chemischen Laboratorium der Universität am Chemischen Praktikum teil und bestand am 5. März 1929 die zweite Verbandsprüfung.

Seit S. H. 1929 bin ich an der Universität Marburg-L. als Studierender der Chemie und Nahrungsmittelchemie eingeschrieben und legte am 17. Dezember 1929 die Vorprüfung für Nahrungsmittelchemiker ab. Im S. H. 1931 war ich Hilfsassistent bei den Pharmakognostisch-mikroskopischen Übungen im Botanischen Institut der Universität.

Seit S. H. 1929 war ich im Pharmazeutisch-chemischen Institut der Universität Marburg auf Veranlassung von Herrn Professor Dr. Brand mit der Abfassung der vorliegenden Arbeit beschäftigt. Das Rigorosum bestand ich am 24. Februar 1932. Seitdem halte ich mich in Marburg auf.

Meine akademischen Lehrer waren:

in Karlsruhe: v. Antropoff, Baldus, Boehm, Drews, v. Ehrhardt-Siebold, Freudenberg, Gaede, Göhringer, Henglein, Klein, Krazzer, Lindner, Paulcke, Peppler, Reihlen, Reis, Rupp, Schwarzmann, Spannhake, Tolle, Ungerer, Wehrle.

in München: Fajans, Frauenholz, Kalb, Kraut, Olea, Paul †, Brandtl, Spindler, Täufel, Wieland, Zintl.

in Gießen: Brand, Behaghel, Göze, Helmke, Hirt, Hock, Huntemüller, Kleeberger, Klüpfel, Küster, Meigen, Richter, Schaum, Stinzing.

in Marburg: Brand, Clausen, Grüneisen, Alverdes, Baur, Eimer, Flößner, Geßner, v. Hofmann, Jacobshagen, Johannisson, Mezger, Nordhausen, Siebert †, Strecker, Ubbelohde=Doering.
